

種類	商品名	一般名	服用方法（原則）	食直前服用		朝食時飲み忘れた薬の対応	
	橙線：先発品のみの薬剤	黄線：後発品が発売になっているもの		食直前服用が必須	可能	朝食の2時間後に服用	昼食前・夕食前に服用
スルホニル尿素薬 （SU薬）	オイグルコン	グリベンクラミド	1日1～2回朝または朝夕、食前または食後に経口投与		○	×	×
	ダオニール				○	×	×
	グリミクロン	グリクラジド			○	×	×
	グリミクロンHA				○	×	×
	アマリール	グリメピリド			○	×	×
速効型インスリン分泌促進薬 （グリニド薬）	スターシス	ナテグリニド	1日3回、毎食直前経口投与	◎（食後服用は効果↓↓） ◎（食後服用は効果↓↓） ◎（食後服用は効果↓↓）	×	×	
	グルファスト	ミチグリニドカルシウム水和物			×	×	
	シュアポスト（販売中止）	レバグリニド			×	×	
DPP-4阻害薬	グラクティブ	シタグリプチン酸塩水和物	1日1回、経口投与		○	○	○
	ジャヌビア				○	○	○
	ネシーナ	アログリプチン安息香酸塩			○	○	○
	トラゼンタ	リナグリプチン			○	○	○
	テネリア	テネリグリプチン臭化水素酸塩			○	○	○
	オングリザ	サキサグリプチン水和物	1日2回、朝と夕に経口投与		○	○	○
	エクア	ビルダグリプチン			○	○	×
	スイニー	アナグリプチン			○	○	×
	ザファテック	トレラグリプチンコハク酸			○	○	○
	マリゼブ	オマリグリプチン			○	○	○
GLP-1受容体作動薬	リベルサス	セマグルチド（遺伝子組換え）	起床時に、空腹の状態ですべて服用、服用後30分以上、飲食を避ける	×起床時服用が必須			
イメグリミン	ツイミーグ	イメグリミン塩酸塩錠	1日2回朝、夕に経口投与		○	○	×
ビグアナイド薬	メトグルコ	メトホルミン塩酸塩	1日2～3回に分割して食直前又は食後に経口投与		○	○	×
	グリコラン				○	○	×
	ジベトス	ブホルミン塩酸塩			○	○	×
	ジベトンS				○	○	×
チアゾリジン薬	アクトス	ビオグリタゾン塩酸塩	1日1回朝食前又は朝食後に経口投与		○	○	○
αグルコシダーゼ阻害薬	グルコバイ	アカルボース	1日3回毎食直前に経口投与	○（食直後なら服用可能） ○（食直後なら服用可能） ○（食直後なら服用可能）	×	×	×
	ベイスン	ボグリボース			×	×	×
	セイブル	ミグリトール			×	×	×
SGLT2阻害薬	スーグラ	イブラグリフロジンL-プロリン	1日1回朝食前又は朝食後に経口投与		○	○	×
	フォシーガ	ダバグリフロジンプロピレングリコール水和物			○	○	×
	ルセフィ	ルセオグリフロジン水和物			○	○	×
	デベルザ	トホグリフロジン			○	○	×
	カナグル	カナグリフロジン水和物			○	○	×
	ジャディアンス	エンバグリフロジン			○	○	×
	配合薬	リオベル配合錠			アログリプチン＋ビオグリタゾン	1日1回朝食前又は朝食後に経口投与	
ソニアス配合錠		グリメピリド　＋ビオグリタゾン	1日1回朝食前又は朝食後に経口投与		○	×	×
メタクト配合錠		メトホルミン　＋ビオグリタゾン	1日1回朝食後に経口投与		○	○	×
グルベス配合錠		ミチグリニド　＋ボグリボース	1日3回、毎食直前経口投与	◎（食後服用は効果↓↓）	○	×	×
イニシンク配合錠		アログリプチン　＋メトホルミン	1日1回、食直前又は食後に経口投与		○	○	×
エクメット配合錠		ビルダグリプチン＋メトホルミン(2025.6～)	1日2回、朝夕に経口投与		○	○	×
メトアナ配合錠		アナグリプチン　＋メトホルミン	○		○	×	
カナリア配合錠		カナグリフロジン＋テネリグリプチン	1日1回、朝食前又は朝食後		○	○	×
スージャヌ配合錠		イブラグリフロジン＋シタグリプチン			○	○	×
トラディアンス配合錠		エンバグリフロジン＋リナグリプチン			○	○	×