

カラーで示した「インスリン製剤」と「SU 薬・グリニド薬」が低血糖を起こす危険がある薬です

【インスリン製剤】	代表的な薬品名	対応（一例）
中間型・持効型	ランタス、インスリングラルギン、トレシーバ	継続（中止しない）
超速効型・速効型	ノボラピッド、ヒューマログ、アピドラ フィアスプ、ルムジェブ	食事量、血糖値に応じて調整
※頻回な血糖値/ケトン体測定が望ましい		
【経口血糖降下薬】	代表的な薬品名	対応（一例）
SU薬・グリニド薬	グリミクロン、オイグルコン、グリメピリド アマリール、ジメリン、デアメリンS グリクラジド、グリベンクラミド、ダオニール ナテグリニド、スターシス、ファスティック ミチグリニド、シュアポスト	医療機関を受診して中止、減量
α -グルコシダーゼ阻害薬	アカルボース、ミグリトール、セイブル ボグリボース、ベイスン	消化器症状の強い時は中止
ビグアナイド薬	メトホルミン、メトグルコ	中止
チアゾリジン薬	アクトス、ピオグリタゾン	中止が望ましい
インクレチン薬	テネリア、エクア、ジャヌビア、グラクティブ スイニー、オングリザ、トラゼンタ ザファテック、マリゼブ ビクトーザ（リラグルチド） トルリシティ（デュラグルチド） オゼンピック、リベルサス（セマグルチド） リキスミア（リキシセナチド） マンジャロ（チルゼパチド）	医療期間を受診して継続又は中止
SGLT2阻害薬	スーグラ（イブラグリフロジン） フォシーガ（ダパグリフロジン） ルセフィ（ルセオグリフロジン） デベルザ（トホグリフロジン） カナグル（カナグリフロジン）	中止
イメグリミン	ツイミーグ	中止が望ましい